

La reproduction sexuée chez le sanglier.

Le rut du sanglier se déroule principalement au mois de décembre, sauf au cours des années où la nourriture est très abondante. Dans ce cas, il peut débuter mi ou fin septembre. Les vieux mâles solitaires sortent alors de leur gîte habituel, et peuvent parfois parcourir de très longues distances pour rechercher des femelles à couvrir. C'est la laie meneuse, en étant en chaleur la première, qui, au sein de la compagnie, déclenche les chaleurs chez les autres femelles du groupe. Quelques temps avant, elle a pris soin de laisser sur les arbres alentour des traces de bave et de sécrétions des glandes lacrymales, qui préviennent les mâles.


Dès que l'un d'eux a rejoint le groupe, il chasse tous les autres mâles y compris les plus jeunes. Lorsque deux grands mâles convoitent en même temps un groupe de femelles, ils s'affrontent en de violents combats. L'issue rarement fatale, peut laisser malgré tout de cruelles blessures.

La gestation dure généralement, 3 mois, 3 semaines et 3 jours (115 jours). La mise-bas survient de mars à avril.

La portée comprend généralement de 3 à 8 marcassins. La naissance a lieu dans un nid appelé chaudron. Les petits le quittent définitivement au cours de leur deuxième semaine. Le poids des marcassins à la naissance varie de 600 à 1000 g. et leur allaitement dure 12 semaines environ, mais les premiers aliments solides sont mangés dès la deuxième semaine. La livrée rayée se mue au cours du 3ème mois.

L'émancipation a lieu à 6 mois. Les jeunes femelles restent dans le groupe avec leur mère.

La maturité sexuelle survient entre 9 et 18 voire 24 mois, selon le sexe. La croissance est complètement terminée vers 4-6 ans.



Accouplement entre un sanglier et une laie*. Au cours de l'accouplement, le sanglier dépose son *sperme** à l'entrée des *voies génitales** de la femelle. Il faut ensuite plusieurs heures aux spermatozoïdes pour parvenir jusqu'aux cellules reproductrices femelles.



Une laie et ses marcassins*. Après une *gestation** de 4 mois dans les voies génitales de la femelle entre 3 et 8 marcassins sont mis au monde.